

Sledování dekubitálních lézí u pacientů s neurologickým onemocněním – analýza Národního registru hospitalizovaných

The Pressure Ulcers Monitoring in Patients with Neurological Diseases – Analyse of the National Register of Hospitalized Patients

Souhm

Cíl: Cílem studie bylo analyzovat hospitalizační případy s uvedenou diagnózou dekubitální léze (L89) dle MKN-10 u pacientů s vybraným neurologickým onemocněním. *Metodika a soubor:* Retrospektivní observační průřezová studie s využitím rutinně sledovaných dat z Národního registru hospitalizovaných akutní i neakutní lůžkové péče v České republice (2007–2014). *Výsledky:* Z 17 762 854 záznamů bylo 8 150 (0,05 %) s vybranou neurologickou diagnózou i dekubitem (L89). Podrobná analýza byla provedena u 4 924 záznamů (0,03 %); pacienti s vybranou neurologickou diagnózou i dekubitem jako hlavní hospitalizační diagnózou (n = 75); neurologické diagnózy jako hlavní hospitalizační diagnózy a dekubitus jako vedlejší diagnóza (n = 3 248); dekubitus jako jediná hlavní diagnóza u pacientů s neurologickým onemocněním (n = 1 601). Výskyt neurologických diagnóz: poranění a krvácení do mozku (n = 2 766), neurodegenerativní a onkologická onemocnění (n = 1 707), traumatická poškození a poranění míchy (n = 451). *Závěr:* Délka hospitalizace u pacientů s dekubitem se v akutní lůžkové péči liší dle hlavní neurologické diagnózy a toho, zda byl dekubitus uveden jako hlavní či vedlejší diagnóza (p < 0,001). Délka hospitalizace pacientů s dekubitem v dlouhodobé péči je rozdílná u různých stupňů dekubitu (p = 0,040). Věk pacientů s dekubitem se statisticky významně liší v akutní i dlouhodobé péči dle hlavní neurologické diagnózy a stupně dekubitu.

Abstract

Aim: The aim of this study was to analyse hospital stays related to pressure ulcers (according to ICD 10) in acute and long-term care facilities in the Czech Republic (2007–2014) in neurologically ill patients with limited mobility. *Material and methods:* Observational cross-sectional study using routinely collected data from the National Register of Hospitalized Patients. *Results:* Of total 17,762,854 hospital records 8,150 (0.05%) had the selected neurological diagnosis and pressure ulcers (L89). Detailed analyses were performed in 4,924 records (0.03%); patients with the selected neurological diagnosis and with a pressure ulcer as a primary diagnosis (n = 75); neurological diagnosis as the primary diagnosis and pressure sores as a secondary diagnosis (n = 3,248); a pressure sore as the only primary diagnosis in patients with a selected neurological diagnosis (n = 1,601). Neurological diagnoses included: brain injury and bleeding (n = 2,766); neurodegenerative and oncological diseases (n = 1,707); spinal cord traumatic injury (n = 451). *Conclusion:* Duration of hospitalization in patients with pressure ulcers in an acute care setting differs according to the main neurological diagnosis and whether the pressure ulcer was listed as the primary or secondary diagnosis (p < 0.001). Duration of hospital stay differs in an long-term care setting according to the grade of pressure ulcer (p = 0.040). In acute and long-term settings, the age of patients with pressure ulcers is statistically significantly different according to the neurological diagnosis and grade of pressure sore (p < 0.001).

<http://dx.doi.org/10.14735/amcsnm.201658>

Tato práce byla podpořena z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 15-29111A s názvem: Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy. The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zaslané do biomedicínských časopisů.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE "uniform requirements" for biomedical papers.

A. Pokorná¹, K. Benešová^{2,3},
J. Mužík^{2,3}, P. Bůřilová¹,
J. Jarkovský^{2,3}, L. Dušek^{2,3}

¹Katedra ošetřovatelství, LF MU, Brno
²Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

³Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha



doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství
LF MU

Kamenice 5
625 00 Brno

e-mail: apokorna@med.muni.cz

Přijato k recenzi: 21. 7. 2016

Přijato do tisku: 11. 8. 2016

Klíčová slova

epidemiologie – dekubitus – hospitalizace – monitorování – národní registry – neurologické onemocnění

Key words

epidemiology – pressure ulcer – hospitalization – monitoring – national registries – neurological diseases

International collaboration is essential for pressure ulcer management

Pressure ulcers are one of the biggest patient safety challenges facing healthcare worldwide. They have a major negative effect on the patient's quality of life and health, are associated with increased morbidity and mortality, and generate considerable costs [1–3]. Prevalence rates of up to 72.5% have been reported, with large variations between countries and clinical setting [4]. Despite quality improvement initiatives, non-adherence to pressure ulcer guidelines is widespread. Studies have shown that only 10% of patients at risk received fully adequate prevention [5,6], while 70% of patients who were not at risk received some pressure ulcer prevention [6].

Effective pressure ulcer prevention and treatment is requires sharing information and collaboration. Not only within health care teams [7,8] and between health care teams and patients/carers [7], but also in research and policy.

That is why the conference on pressure ulcers in the Czech Republic is spot on. This conference is an excellent example of sharing knowledge and expertise at an international level. Speakers from all healthcare disciplines will present on a variety of topics related to pressure ulcer prevention and treatment. Presentations on incontinence associated dermatitis, nutrition, surgical debridement and pressure mapping show that clinical topics are relevant across borders. But also presentations and discussions about monitoring, policymaking and implementation at a national level are relevant in every country and at international level. The European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) is therefore proud to support this national conference. On behalf of the EPUAP, I wish the organisers, speakers and all the attendants an exciting and inspiring day and look forward to future collaboration.

*prof. Lisette Schoonhoven, PhD
president of the European Pressure Ulcer Advisory Panel*

References

1. Gorecki C, Nixon J, Madill A, et al. What influences the impact of pressure ulcers on health-related quality of life? A qualitative patient-focused exploration of contributory factors. *J Tissue Viability*, 2012;22(1):3–12. doi: 10.1016/j.jtv.2011.11.001.
2. Demarre L, Van Lancker A, Van Hecke A, et al. The cost of prevention and treatment of pressure ulcers: a systematic review. *Int J Nurs Stud* 2015;52(11):754–74. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.06.006.
3. Thomas DR, Goode PS, Tarquine PH, et al. Hospital-acquired pressure ulcers and risk of death. *J Am Geriatr Soc* 1996;44(12):1435–40.
4. National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline 2014.
5. Vanderwee K, Defloor T, Beeckman D, et al. Assessing the adequacy of pressure ulcer prevention in hospitals: a nationwide prevalence survey. *BMJ Qual Saf* 2011;20(3):260–7. doi: 10.1136/bmjqs.2010.043125.
6. Vanderwee K, Clark M, Dealey C, et al. Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. *J Eval Clin Pract* 2007;13(2):227–35.
7. Pinkney L, Nixon J, Wilson L, et al. Why do patients develop severe pressure ulcers? A retrospective case study. *BMJ Open* 2014;4(1):e004303. doi: 10.1136/bmjopen-2013-004303.
8. Spilsbury K, Nelson A, Cullum N, et al. Pressure ulcers and their treatment and effects on quality of life: hospital inpatient perspectives. *J Adv Nurs* 2007;57(5):494–504.

Úvod

Dekubitální léze jsou charakterizovány jako lokalizovaná poškození kůže a hlubších tkáňových vrstev obvykle v místech kostních prominencí (predilekčních místech) jako důsledek místních příčin – lokalizovaného tlaku a tření [1,2]. Dekubitální léze znamenají významnou zátěž pro pacienty jak v oblasti fyzické, psychologické a psychosociální [3], tak souvisí s vyšší ekonomickou zátěží pro poskytovatele zdravotních i sociálních služeb [4,5]. U pacientů s neurologickými diagnózami, zejména pokud došlo k ovlivnění mobility a vědomí pacienta, je riziko vzniku dekulitálních lézí vyšší [6,7]. Zhodnocení výskytu (incidence i prevalence) dekulitálních lézí u pacientů s etiologicky různou neurologickou diagnózou může napomoci v identifikaci rizikových faktorů, klíčových bodů péče (tzv. trigger points) a vhodných preventivních i terapeutických intervencí. Nejen v České republice, ale i v zahraničí neexistuje jednotná metodika pro sledování výskytu dekulitálních monitorovacích procesů je závislá na lokálním i now how jednotlivých poskytovatelů péče

přesto, že informace o výskytu dekulitů jsou považovány za indikátor kvality péče a jsou významné pro zhodnocení ekonomické náročnosti péče (prodloužení hospitalizace, zvýšená spotřeba léčiv a zdravotnických prostředků k terapii komplikací apod.) [8]. Studie ze zahraničí uvádějí prevalenci dekulitálních lézí v rozmezí od 4,3 do 30,8 %, uvedený rozptyl je dán právě zmíněnou nejednotnou metodologií sběru dat [9–12]. Aktuálně v České republice neexistuje zdroj, který by umožnil specifické sledování výskytu dekulitálních lézí u pacientů, a proto byl k analýze využit Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), v němž jsou zaznamenáni všichni pacienti, jejichž hospitalizace byla ukončena ve sledovaném období let 2007–2014.

Cíle

Hlavním cílem studie bylo ověřit, jaká povinně a rutinně zaznamenaná data v NRHOSP lze využít ke zhodnocení výskytu dekulitů u pacientů s vybranou neurologickou diagnózou a která mohou být využita ke zhodnocení dopadu dekulitálních lézí na individuálního pacienta

a zdravotní systém. Zjistit, zda a jak se liší délka hospitalizace a věk u neurologických pacientů s dekulitální lézí nejen v akutní, ale i neakutní lůžkové péči. Jaké výkony (léčebné intervence) jsou nejčastěji vykazovány u pacientů s dekulitami s neurologickou diagnózou.

Metodika

Analýzována byla data z NRHOSP za období let 2007–2014. Zařazeny byly záznamy, u nichž byla vykazána neurologická diagnóza (schéma 1) a zároveň byla uvedena přítomnost dekulitální léze dle MKN-10 (L89). Statistická analýza dat byla provedena s využitím IBM SPSS verze 22.0.0.1 pomocí Mannova-Whitneyova U testu a Kruskalova-Wallisova testu na 5% hladině významnosti.

Metodika a zařazení hospitalizačních záznamů s neurologickými diagnózami

Jak vyplývá ze schéma 1, zařazeny byly záznamy hospitalizační pacientů s vybranou neurologickou diagnózou dle MKN-10, přičemž byli pacienti rozděleni do tří skupin:

17 762 854 (100 %)

→ 8 150 (0,05 %)

n = 15

n = 214

n = 809

n = 3 018

Celkový počet záznamů v NRHOSP za období 2007–2014 (lůžka akutní i následné péče)

Záznamy s uvedenou neurologickou diagnózou* i dekulitální vředem a proleženinou (L89) **kdekoliv** během hospitalizace

Neurologická diagnóza* i dekulitální vřed a proleženina (L89) jako hlavní hospitalizační diagnóza

Neurologická diagnóza* jako **hlavní** hospitalizační diagnóza, dekulitální vřed a proleženina (L89) jako **vedlejší** hospitalizační diagnóza

n = 1 601

n = 2015

Dekubitální vřed a proleženina (L89) jako **jediná** hlavní diagnóza za hospitalizační pobyt

Dekubitální vřed a proleženina (L89) jako **jedna z více hlavních diagnóz** za hospitalizační pobyt (jímé hlavní diagnózy nejsou neurologické*)

Zařazené záznamy

n = 4 924

Neurologická diagnóza* i dekulitální vřed a proleženina (L89) pouze jako **vedlejší** hospitalizační diagnóza

*Uvažované diagnózy: poranění a krvácení do mozku: I60–I61, I69 kromě I69.8; neurodegenerativní a onkologická onemocnění: C41.2, C41.4, C71, C72.0, C72.1, D33, G04, G05, G80–G82, G95, M43, M46, M47, M48.4, M48.5, M50, M51; traumatická postižení a poranění mléčny: S12–S14, S22–S24, S32–S34, T06.0, T06.1, T08, T09.3, T09.4.

Schéma 1. Zařazení hospitalizačních záznamů s neurologickými diagnózami.

Poranění a krvácení do mozku: I60–I61, I69 kromě I69.8.


Neurodegenerativní a onkologická onemocnění: C41.2, C41.4, C71, C72.0, C72.1, D33, G04, G05, G80–G82, G95, M43, M46, M47, M48.4, M48.5, M50, M51.

Traumatická postižení a poranění míchy: S12–S14, S22–S24, S32–S34, T06.0, T06.1, T08, T09.3, T09.4.


Pacienti byli rozřazeni do diagnostických kategorií na základě hlavní hospitalizační diagnózy. V případě dekubitálního vředu a proleženiny (L89) na místě hlavní hospitalizační diagnózy byla diagnostická kategorie určena na základě vedlejší hospitalizační diagnózy. V případech, kdy ani dekubitální léze ani neurologická diagnóza nebyly uvedeny jako hlavní diagnózy, nebyl záznam zařazen do analýzy ($n = 3\ 226$; 0,02 %).

Výsledky a diskuze


Z celkového počtu 17 762 854 hospitalizačních záznamů bylo identifikováno 8 150 (0,05 %)



Graf 1. Trend v počtu vykázaných případů výskytu dekubitu u neurologických pacientů.



Graf 2. Trend v počtu vykázaných případů výskytu dekubitu podle skupiny onemocnění.



Graf 3. Vykazování stupně dekubitů v časové ose.

s vybranou neurologickou diagnózou i s diagnózou dekubitální vřed a proleženina (L89) zaznamenanými kdekoli v průběhu hospitalizace. Podrobná analýza ale byla provedena u 4 924 záznamů (0,03 %), které zahrnovaly jednak pacienty s vybranou neurologickou diagnózou i dekubitem jako hlavní hospitalizační diagnózou (n = 75); dále případy s neurologickou diagnózou jako hlavní hospitalizační diagnózou a dekubitem jako vedlejší diagnózou (n = 3 248); a záznamy, kdy byl dekubitus jako jediná hlavní diagnóza u pacienta s vybraným neurologickým onemocněním (n = 1 601). Analyzovány byly záznamy s výskytem neurologických diagnóz rozdělených do tří skupin (viz metodika): poranění a krvácení do mozku (n = 2 766; 56,2 %), neurodegenerativní a onkologická onemocnění (n = 1 707; 34,7 %), traumatická postižení a poranění míchy (n = 451; 9,2 %).

Výskyt dekubitů u pacientů s různou neurologickou diagnózou

Jak je patrné z grafu 1, vykazování diagnóz dekubitálních lézí má stoupající tendenci s tím, že diagnóza L89 je častěji uvedena kdekoli během hospitalizace – tedy ne na místě hlavní diagnózy. Lze předpokládat, že deku-

ovlivňuje rozsah terapeutických postupů a rozsah ekonomických nákladů na léčbu a také ovlivňuje prognózu stavu pacienta [1–3]. V této souvislosti je nezbytné zmínit se o tom, že existuje riziko nekonzistence záznamů v lékařské a ošetřovatelské dokumentaci. Zatímco lékaři využívají klasifikaci stupně dekubitů dle MKN-10, ošetřovatelský personál využívá klasifikaci dle Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) anebo Národního poradního panelu pro otázky dekubitů (NPUAP) [1,2]. U 1 916 (38,9 %) hospitalizačních případů nebylo možné zjistit stupeň dekubitu. V letech 2007 a 2008 nebyly stupně dekubitů vůbec rozlišovány, ale v následujících letech se počet nediferencovaných stupňů dekubitů snižoval (graf 3). K ovlivnění frekvence diferenciací stupňů dekubitů jistě přispěla skutečnost, že v roce 2009 byl vydán Věstník MZ ČR č. 6/2009 uvádějící metodiku hodnocení a dokumentování dekubitálních lézí. Nejčastěji byly za celé sledované období vykazovány dekubity čtvrtého stupně (21,1 %), což je logické, protože jejich léčba je nákladná, často vyžaduje chirurgickou intervenci, a je proto vykazována v rámci lékařských diagnóz. Následuje třetí stupeň dekubitů, který byl vykazován v 17,2 %, druhý stupeň v 13,1 %. Nejméně často byl za celé sledované období vykazován první stupeň dekubitu. Logickým zdůvodněním je, že první stupeň dekubitu je považován za problém ošetřovatelský, který nevyžaduje závažné intervence lékařů, ale stále je rizikem progresu poškození kůže a tkání a dalších komplikací, kterým je v případě využití vhodných intervencí možné předejít [13–15]. Při hodnocení, jaký stupeň dekubitu se vyskytuje u pacientů s rozdílnou neurologickou diagnózou, bylo zjištěno, že záznamy se neliší u prvního stupně dekubitů, ale vyšší stupně dekubitů byly vykazovány častěji u pacientů v kategoriích neurodegenerativních a onkologických onemocnění (graf 4). Svou roli však také sehrává schopnost zaznamenávat jejich osob správně identifikovat stupeň dekubitu [16–18]. Ve studii realizované ve Švédsku a USA byla srovnávána prevalence dekubitálních lézí třetího a čtvrtého stupně. Jedním z prvních kroků byla právě snaha o jednotnou klasifikaci dekubitů, a přesto byly zjištěny významné rozdíly v prevalenci ve prospěch nemocnic v USA [17].

Prospektivní studie realizovaná v Číně naopak uvádí, že nejčastěji byly zaznamenávány dekubity prvního a druhého stupně, ale to mohlo být ovlivněno právě použitou prospektivní metodologií [18].


Stupně dekubitů u pacientů s neurologickou diagnózou

Stupeň dekubitální léze (dle MKN-10 rozdělený na čtyři základní stupně) významně

Výkony vykázané u pacientů s dekubity a neurologickou diagnózou

Většina dekubitálních lézí u pacientů s neurologickou diagnózou je léčena konzervativně, ale u závažných stavů je nezbytná různě rozsáhlá intervence a terapeutický výkon [4,5,7,19–24]. Ve sledovaném souboru hospitalizačních záznamů bylo 87,4 % z nich bez výkonu a jen u 12,6 % byl uveden výkon (data se týkají pouze hospitalizací v zařízeních akutní péče). Nejčastěji vykazovaným výkonem byla „Specializovaná péče o rozsáhlou dekubitální plochu“ (kód výkonu 62840) v celkovém počtu 8 129 výkonů realizovaných v průběhu 367 hospitalizací (průměrně 21,6 výkonů za hospitalizaci). Celkem 99,1 % (n = 8 058) těchto výkonů bylo vykázáno u pacientů zařazených ve skupině pacientů s neurodegenerativním a onkologickým onemocněním. Druhým nejčastěji vykazovaným výkonem byl „Převaz rány metodou V.A.C.“ (kód výkonu 51850) v celkovém počtu 842 výkonů vykázaných u 72 hospitalizací (průměrně 11,7 výkonů za hospitalizaci). Rovněž výkon s využitím podtlakové terapie byl nejčastěji vykázan u pacientů s neurodegenerativním a onkologickým onemocněním (84,3 %; n = 710) a 12,2 % (n = 103) výkonů bylo provedeno u pacientů s traumatickým postižením a poraněním míchy a zejména často byl tento výkon vykázan u pacientů s poraněním a krvácením do mozku (3,4 %; n = 29). V pořadí třetí nejčastěji vykazovaný výkon byla „Extrypace pseudocysty dekubitu“ (kód výkonu 61127) v celkovém počtu 505 výkonů za 346 hospitalizací s průměrným počtem 1,5 výkonu na jednu hospitalizaci a opět byl tento výkon nejčastěji vykazován u skupiny pacientů s neurodegenerativním a onkologickým onemocněním (96,7 %; n = 265). Chirurgické výkony jako např. Transpozice muskulárního laloku (kód 61169), Transpozice fasciokutánního laloku (kód 61167), Uzavření defektu kožním lalokem místním od 10 do 20 cm² (kód 61149) apod. byly vykazovány v méně než 4 % ze všech hospitalizací s výkonem, přičemž frekvence výkonu byla průměrně 1–1,4 výkonu na jednu hospitalizaci. Léčba dekubitálních lézí je ale často realizována s využitím zvlášť účtovaných zdravotnických prostředků, materiálů pro tzv. vlhké či fázové hojení ran a tento typ terapie není běžně vykazován. Léčba je tak hrazena z prostředků daného pracoviště. To je také důvod, proč je terapie dekubitálních lézí mnohem nákladnější než jejich prevence, jak dokládají zahraniční studie [17,18]. V České republice obdobné analýzy doposud absentiují.

Podíl případů dle stupně dekubitu



* U 1 916 (38,9 %) hospitalizačních případů nebylo možné zjistit stupeň dekubitu.

Graf 4. Stupeň dekubitu podle skupiny.

Tab. 1. Délka hospitalizace neurologických pacientů s dekubitem.

| Délka hospitalizace (počet dní) | n | Průměr ± SD | Medián (5.–95. perc.) | p ^a |
|--|-------|--------------|-----------------------|----------------|
| Celkem | 4 924 | 47,5 ± 102,1 | 22 (2; 152) | |
| Hospitalizace s akutní lůžkovou péčí | | | | |
| celkem | 3 249 | 31,1 ± 43,4 | 17 (2; 104) | |
| L89 jako hlavní diagnóza | 1 283 | 26,6 ± 36,1 | 15 (3; 89) | < 0,001 |
| L89 jako vedlejší diagnóza | 1 966 | 34,0 ± 47,4 | 19 (2; 114) | |
| poranění a krvácení do mozku | 1 541 | 28,5 ± 39,4 | 15 (2; 98) | |
| neurodegenerativní a onkologická onemocnění | 1 390 | 33,9 ± 48,4 | 20 (3; 112) | < 0,001 |
| traumatická postižení a poranění míchy | 318 | 31,3 ± 37,8 | 16 (2; 114) | |
| stupeň dekubitu 1 | 314 | 26,7 ± 33,6 | 15 (2; 94) | |
| stupeň dekubitu 2 | 487 | 25,3 ± 33,8 | 15 (3; 79) | 0,291 |
| stupeň dekubitu 3 | 629 | 30,5 ± 38,9 | 16 (3; 110) | |
| stupeň dekubitu 4 | 716 | 33,2 ± 52,6 | 16 (1; 118) | |
| Hospitalizace bez akutní lůžkové péče | | | | |
| celkem | 1 675 | 79,2 ± 159,6 | 42 (3; 250) | |
| L89 jako hlavní diagnóza | 393 | 62,9 ± 84,6 | 37 (3; 191) | 0,093 |
| L89 jako vedlejší diagnóza | 1 282 | 84,3 ± 176,1 | 44 (3; 273) | |
| poranění a krvácení do mozku | 1 225 | 80,9 ± 171,2 | 42 (3; 251) | |
| neurodegenerativní a onkologická onemocnění | 317 | 78,5 ± 135,8 | 41 (3; 258) | 0,765 |
| traumatická postižení a poranění míchy | 133 | 66,3 ± 84,4 | 44 (5; 185) | |
| stupeň dekubitu 1 | 163 | 90,1 ± 126,4 | 56 (3; 256) | |
| stupeň dekubitu 2 | 160 | 75,0 ± 113,4 | 37 (2; 263) | 0,040 |
| stupeň dekubitu 3 | 216 | 84,4 ± 178,4 | 42 (5; 234) | |
| stupeň dekubitu 4 | 323 | 73,3 ± 144,9 | 39 (3; 199) | |

*U 1 916 (38,9 %) hospitalizačních případů nebylo možné zjistit stupeň dekubitu.

^a Uvedena p hodnota Mannova-Whitneyho U testu/Kruskalova-Wallisova testu.

Tab. 2. Věk neurologických pacientů s dekubitem.

| Věk | n | Průměr ± ± SD | Medián (5.–95. perc.) | p* |
|--|-------|------------------|--------------------------|---------|
| Celkem | 4 924 | 67,0 ± 18,3 | 71 (30; 89) | |
| Hospitalizace s akutní lůžkovou péčí | | | | |
| celkem | 3 249 | 64,1 ± 19,6 | 68 (28; 89) | – |
| L89 jako hlavní diagnóza | 1 283 | 56,0 ± 19,8 | 57 (25; 86) | < 0,001 |
| L89 jako vedlejší diagnóza | 1 966 | 69,3 ± 17,5 | 74 (32; 90) | |
| poranění a krvácení do mozku | 1 541 | 76,2 ± 10,6 | 78 (58; 91) | |
| neurodegenerativní a onkologická onem. | 1 390 | 50,1 ± 17,6 | 50 (22; 79) | < 0,001 |
| traumatická postižení a poranění míchy | 318 | 66,3 ± 20,9 | 72 (26; 92) | |
| stupeň dekubitu 1 | 314 | 67,9 ± 19,3 | 73 (32; 91) | |
| stupeň dekubitu 2 | 487 | 67,7 ± 18,5 | 72 (30; 90) | < 0,001 |
| stupeň dekubitu 3 | 629 | 63,9 ± 19,7 | 67 (29; 89) | |
| stupeň dekubitu 4 | 716 | 62,6 ± 18,9 | 66 (27; 88) | |
| Hospitalizace bez akutní lůžkové péče | | | | |
| celkem | 1 675 | 72,8 ± 14,0 | 75 (44; 89) | – |
| L89 jako hlavní diagnóza | 393 | 69,9 ± 15,6 | 73 (37; 89) | < 0,001 |
| L89 jako vedlejší diagnóza | 1 282 | 73,8 ± 13,4 | 76 (47; 90) | |
| poranění a krvácení do mozku | 1 225 | 76,6 ± 9,8 | 78 (59; 90) | |
| neurodegenerativní a onkologická onem. | 317 | 58,8 ± 16,5 | 62 (29; 83) | < 0,001 |
| traumatická postižení a poranění míchy | 133 | 71,3 ± 18,6 | 78 (27; 92) | |
| stupeň dekubitu 1 | 163 | 72,4 ± 13,7 | 75 (48; 90) | |
| stupeň dekubitu 2 | 160 | 74,1 ± 14,4 | 78 (46; 90) | 0,015 |
| stupeň dekubitu 3 | 216 | 74,5 ± 12,7 | 78 (52; 89) | |
| stupeň dekubitu 4 | 323 | 70,3 ± 15,8 | 74 (33; 89) | |

* U 1 916 (38,9 %) hospitalizačních případů nebylo možné zjistit stupeň dekubitu.

Uvedena p hodnota Mannova-Whitneyho U testu/Kruskalova-Wallisova testu.

Souhrnná charakteristika

analyzovaných hospitalizačních záznamů dle délky hospitalizace a věku pacientů

Z celkového počtu 4 924 analyzovaných hospitalizačních záznamů (průměrná délka hospitalizace 47,5 dne; SD ± 102,1) bylo 3 249 (66 %) vykázáno v akutní lůžkové péči s průměrnou délkou 31,1 dne (SD ± 43,4) a 1 675 (34 %) záznamů bez akutní lůžkové péče s průměrnou délkou hospitalizace 79,2 dní (SD ± 159,6). Hospitalizace pacientů s neurologickou diagnózou a dekubitální lézí byla v neakutní péči více než dvakrát delší než v péči akutní. Odborné zdroje uvádějí, že dekubitální léze jsou považovány za možnou příčinu prodloužení hospitalizace [1,2]. Z námi analyzovaných dat však není možné odvodit, zda mohli být dekubitus příčinou

prodloužení hospitalizace jako komplikující stav či zda mohl být celkový stav pacienta pravděpodobnou příčinou vzniku dekubitu. Další informace související s délkou hospitalizace ve vztahu k diagnóze dekubitální léze, jak v akutní, tak neakutní lůžkové péči dokumentuje tab. 1. V případech, kdy byla dekubitální léze uvedena jako sekundární diagnóza, tedy zřejmě komplikující základní diagnózu pacienta, prodlužovala se také doba hospitalizace, statisticky významný rozdíl byl ale potvrzen pouze pro hospitalizace v akutní lůžkové péči ($p < 0,001$). Pokud byl dekubitus uveden jako hlavní diagnóza, byla hospitalizace kratší průměrně o osm dní. Délka hospitalizace byla rozdílná také podle typu neurologické diagnózy. V akutní péči byla nejdelší průměrná hospitalizace u pacientů s neuro-

degenerativním a onkologickým onemocněním (33,9 dní) a v neakutní péči byla nejdelší průměrná hospitalizace u pacientů s poraněním a krvácením do mozku (průměrně 80,9 dní). Statisticky významný rozdíl byl ale opět potvrzen pouze pro hospitalizace v akutní lůžkové péči ($p < 0,001$). Zajímavé je, že pacienti s diagnózou poranění a krvácení do mozku, kam byli zařazeni zejména pacienti s cévní mozkovou příhodou, byli nejkratší dobu hospitalizováni v akutní péči (průměrně 28,5 dne) a naopak nejdéle byli s touto diagnózou hospitalizováni v neakutní péči (průměrně 80,9 dní), tedy téměř třikrát delší dobu. Jak je patrné dále z tab. 2, v této kategorii byli také pacienti s nejvyšším průměrným věkem (akutní péče 76,2 a neakutní 76,6 let). Z uvedeného vyplývá, že zejména hospitalizace pacientů vyššího věku s diagnózou krvácení do mozku znamenají významnou zátěž pro neakutní, tedy následnou a dlouhodobou péči. Námi zjištěná data nepotvrzují vysoký počet dekubitálních lézí u pacientů s traumatickým postižením a poraněním míchy, ani jejich relativně častou potřebu operativního řešení jako v zahraničí [21,22] přesto, že riziko vzniku dekubitálních lézí u pacientů s poraněním míchy je v průběhu života udáno až jako 95% [22–24]. Opět je nezbytné upozornit na skutečnost, že naše studie využívá běžně zaznamenávaná administrativní data o hospitalizacích a není jednoznačně zaměřena na možnost zhodnocení reálného výskytu dekubitálních lézí, ale pouze na jejich záznam v podobě vykázané lékařské diagnózy. Dalším zajímavým zjištěním je, že vykázaný stupeň dekubitu statisticky významně nesouvisel s délkou hospitalizace v akutní péči ($p = 0,291$), ale se zvyšující se závažností tlakové léze se hospitalizace prodlužovala (rozdíl mezi hospitalizací s prvním a čtvrtým stupněm dekubitu činil průměrně sedm dní). V neakutní péči však byla ověřena statisticky významná souvislost mezi stupněm dekubitu a délkou hospitalizace ($p = 0,040$). Nejdelší hospitalizace byla vykázána u pacientů s prvním stupněm dekubitu (průměrně 90,1 dní) a nejkratší u pacientů s vykázaným čtvrtým stupněm dekubitu (průměrně 73,7 dní). Vyšší a závažnější stupeň dekubitu je jednoznačně spojen s výskytem komplikací (lokální infekce, bolest, riziko systémových infekcí a nozokomiálních infekcí, renálních insuficíencí apod.), celkovým zhoršením stavu pacienta a rizikem rehospitalizací či vyšší mortalitou [1,2,15]. Vzhledem k faktu, že z dat

NRHOSP nelze zjistit dobu vzniku dekubitální léze, což je limitem studie, dá se pouze předpokládat, že pacienti mohli být přeloženi s již vzniklým dekubitem závažnějšího stupně a v důsledku komplikací byla jejich hospitalizace kratší a mohla skončit buď překladem do zařízení dlouhodobé péče, či úmrtím. Tab. 2 shrnuje informace o věku pacientů s dekubitem v analyzovaných záznamech. U hospitalizačních záznamů pacientů s dekubitem v akutní péči byl průměrný věk pacientů o osm let nižší než u pacientů v neakutní péči. Statisticky významné rozdíly byly ověřeny ve všech sledovaných oblastech ve vztahu k věku pacientů jak v akutní, tak neakutní péči. V případech, kdy byla dekubitální léze uvedena jako hlavní diagnóza, byl také věk pacientů nižší (v akutní péči průměrně 56 let a v neakutní 699 let). V akutní i neakutní péči byli nejmladší pacienti hospitalizováni s neurologickou diagnózou v kategoriích neurodegenerativních a onkologických onemocnění. Stupeň dekubitu také statisticky významně souvisel s věkem pacientů. Jak v akutní, tak neakutní péči byli nejmladší pacienti se záznamem o čtvrtém stupni dekubitu, přičemž průměrný věk pacientů s dekubitem čtvrtého stupně v akutní péči byl 62,6 let a v neakutní péči téměř o osm let více (70,3 let). Nicméně s ohledem na absenci informací o dalších rizikových faktorech mimo věk pacienta by bylo neobjektivní vyvozovat z tohoto zjištění jednoznačné závěry. Obecně je vyšší věk spojován s výskytem dekubitálních lézí [1,2,13,15,25,26], ale v dokumentovaných případech mohli sehrát svou roli například celkový stav u pacientů po traumatu míchy, při neurodegenerativních onemocněních apod.

Data z NRHOSP mohou být i přes výše uvedené limity využita ke srovnání záznamů o výskytu dekubitálních lézí s daty získanými v nově připravovaném softwarovém nástroji pro sběr dat o výskytu dekubitů, který je připravován k využívání v akutní lůžkové péči na základě ověřených zahraničních zkušeností s obdobnými specializovanými měřebními registry [25,26].

Závěr

Přes obecně uznávaný fakt, že reálná incidence dekubitálních lézí nejen u neurologických pacientů je v běžně dostupných administrativních datech podhodnocena, zdůrazňuje prezentovaná studie nutnost

účelného využití dostupných dat jako vhodného ukazatele pro hodnocení nákladovosti, zvýšené potřeby materiálních i personálních zdrojů ve zdravotní péči u pacientů s neurologickou diagnózou a dekubitem. Zjistili jsme, že navzdory možnosti využít významné informace o délce hospitalizace ovlivněné přítomností záznamu o dekubitální lézi, věkové charakteristice pacientů a realizovaných terapeutických intervencích, je výtečnost běžných administrativních dat limitována. Jedním z nejvýznamnějších limitů je nemožnost získání informací o provedení poskytování péče a vzniku dekubitu (např. kdy a kde dekubitus vznikl) anebo informace o aktuálním stavu pacienta (počet pacientů v riziku vzniku dekubitů, stav vědomí, mobility). Nejpodstatnějším přínosem studie je zpracování dat u hospitalizovaných pacientů s neurologickou diagnózou na národním úrovni, kdy bylo ověřeno, že délka hospitalizace se prodlužuje s přítomností sekundární diagnózy dekubitální léze, která je častěji vykazována u pacientů vyššího věku. Hospitalizace je také delší u pacientů s poraněním a krvácením do mozku a s dekubitem jako vedlejší diagnózou v neakutní péči.

Literatura

1. European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel 2009.
2. Haesler E. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia 2014.
3. Langemo DK, Meliland H, Hanson D, et al. The lived experience of having a pressure ulcer: a qualitative analysis. *Adv Skin Wound Care* 2009;13(5):225–35.
4. Stroupe K, Manheim L. Cost of treating pressure ulcers for veterans with spinal cord injury. *Top Spinal Cord Inj Rehabil* 2011;16(4):62–73. doi: <http://dx.doi.org/10.1310/scl1604-62>.
5. Chan BC, Nanwa N, Mittmann N, et al. The average cost of pressure ulcer management in a community dwelling spinal cord injury population. *Int Wound J* 2013;10(4):431–40. doi: [10.1111/j.1742-481X.2012.01002.x](http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-481X.2012.01002.x).
6. Reddy M. Pressure ulcers. *BMJ Clin Evid* 2015;2011:1901.
7. Zakrasek EC, Creasey G, Grew JD. Pressure ulcers in people with spinal cord injury in developing nations. *Spinal Cord* 2015;53(1):7–13. doi: [10.1038/sc.2014.179](http://dx.doi.org/10.1038/sc.2014.179).
8. Gunningberg L, Hommel A, Bååth C, et al. The first national PU prevalence survey in county council and municipality settings in Sweden. *J Eval Clin Pract* 2013;19(5):862–7. doi: [10.1111/j.1365-2753.2012.01865.x](http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2753.2012.01865.x).
9. Kotner J, Dassen T, Lahmann N. Prevalence of deep tissue injuries in hospitals and nursing homes: two cross-sectional studies. *Int J Nurs Stud* 2010;47(6):665–70. doi: [10.1016/j.ijnurstu.2009.11.003](http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.11.003).

10. Moore Z, Cowman Z. Pressure ulcer prevalence and prevention practices in care of the older person in the Republic of Ireland. *J Clin Nurs* 2011;21(3–4):362–71. doi: [10.1111/j.1365-2702.2011.03749.x](http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03749.x).
11. Vanderwee K, Defloor T, Beeckman D, et al. Assessing the adequacy of PU prevention in hospitals: a nationwide prevalence survey. *BMJ Qual Saf* 2011;20(3):260–7. doi: [10.1136/bmjqs.2010.048125](http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs.2010.048125).
12. VanDenKerkhof EG, Friedberg E, Harrison B. Prevalence and risk of pressure ulcers in acute care following implementation of practice guidelines: annual pressure ulcer prevalence census 1994–2008. *J Health Qual* 2011;33(5):58–67. doi: [10.1111/j.1945-1474.2011.0127.x](http://dx.doi.org/10.1111/j.1945-1474.2011.0127.x).
13. Jenkins ML, O'Neal E. Pressure ulcer prevalence and incidence in acute care. *Adv Skin Wound Care* 2010;23(12):556–9. doi: [10.1097/01.ASW.0000391184.43845.c1](http://dx.doi.org/10.1097/01.ASW.0000391184.43845.c1).
14. Coomer NM, McCall NT. Examination of the accuracy of coding hospital-acquired pressure ulcer stages. *Medicare Medicaid Res Rev* 2013;33(4). doi: [10.5600/mmrr.003.04.b03](http://dx.doi.org/10.5600/mmrr.003.04.b03).
15. Russo CA, Steiner C, Spector W. Hospitalizations Related to Pressure Ulcers. [online]. Available from URL: <http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb64.pdf>.
16. Meddings JA, Reichert H, Hofer T, et al. Hospital report cards for hospital-acquired pressure ulcers: how good are the grades? *Ann Intern Med* 2013;159(8):505–13. doi: [10.7326/0003-4819-159-8-201310150-00003](http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-159-8-201310150-00003).
17. Gunningberg L, Donaldson N, Aydin C, et al. Exploring variation in pressure ulcer prevalence in Sweden and the USA: benchmarking in action. *J Eval Clin Pract* 2012;18(4):904–10. doi: [10.1111/j.1365-2753.2011.01702.x](http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2753.2011.01702.x).
18. Jiang Q, Li X, Qu X, et al. The incidence, risk factors and characteristics of pressure ulcers in hospitalized patients in China. *Int J Clin Exp Pathol* 2014;7(5):2387–94.
19. Demarré L, Verhaeghe S, Annemans L, et al. The cost of pressure ulcer prevention and treatment in hospitals and nursing homes in Flanders: A cost-of-illness study. *Int J Nurs Stud* 2015;52(7):1166–79. doi: [10.1016/j.ijnurstu.2015.03.005](http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.03.005).
20. Demarré L, Van Lancker A, Van Hecke A, et al. The cost of prevention and treatment of pressure ulcers: a systematic review. *Int J Nurs Stud* 2015;52(11):1754–74. doi: [10.1016/j.ijnurstu.2015.06.006](http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.06.006).
21. Esлами V, Saadat S, Habibi Arjani R, et al. Factors associated with the development of pressure ulcers after spinal cord injury. *Spinal Cord* 2012;50(12):899–903. doi: [10.1038/sc.2012.75](http://dx.doi.org/10.1038/sc.2012.75).
22. Ljung AC, Stenius MC, Bjelak S, et al. Surgery for pressure ulcers in spinal cord-injured patients following a structured treatment programme: a 10-year follow-up. *Int Wound J* 2016. doi: [10.1111/wji.12609](http://dx.doi.org/10.1111/wji.12609).
23. Clark FA, Jackson JM, Scott MD, et al. Data-based models of how pressure ulcers develop in daily-living contexts of adults with spinal cord injury. *Arch Phys Med Rehabil* 2006;87(11):1516–25.
24. Stroupe K, Manheim L, Evans C, et al. Cost of treating pressure ulcers for veterans with spinal cord injury. *Top Spinal Cord Inj Rehabil* 2011;16(4):62–73. doi: <http://dx.doi.org/10.1310/scl1604-62>.
25. Collier JM. Pressure Ulcer Incidence: the Development and Benefits of 10 Year's experience with an Electronic Monitoring Tool (PUNT) in a UK Hospital Trust. *EWMA J* 2015;15(2):15–20.
26. Ören RF. RUT (Register of Ulcer Treatment) – a winning concept for both patients and the health care sector. *EWMA J* 2009; 9:41–4.